



適用害虫・投薬量・くん蒸時間について

デゲシュ・ジャパン株式会社

農薬登録番号 第7184号 ホストキシソ小型錠剤 PHOSTOXIN PELLET

農薬登録番号 第7185号 ホストキシソ PHOSTOXIN ROUND-100, -333

農薬登録番号 第18468号 ティベック TYVEK

(別記)
括弧内のくん蒸時間は庫外投薬機を用いた場合に限る。

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸時間	くん蒸温度	本剤の使用回数	使用方法	リン化アルミニウムを含む農薬の総使用回数
穀物類 豆類 飼料 種子	サイロ	コクゾウムシ	第7184号 ホストキシソ 小型錠剤	2~5日間	20℃以上	-	くん蒸	
				3~6日間 (2~6日間)	15~20℃			
				4日間以上 (3日間以上)	15℃以下			
コーヒー豆 カカオ豆	コンテナ	ヒラタコクヌストモドキ	容積1㎡当り 2~15錠	2~5日間	20℃以上		くん蒸 ただし、 出庫7日前までに くん蒸を終了する こと	
				3~6日間 (2~6日間)	15~20℃			
				4日間以上 (3日間以上)	15℃以下			
ごま	倉庫	マメゾウムシ類等	第7185号 ホストキシソ 容積1㎡当り 0.5~3錠	2~5日間	20℃以上		くん蒸 ただし、 出庫5日前までに くん蒸を終了する こと	
				3~6日間 (2~6日間)	15~20℃			
				4日間以上 (3日間以上)	15℃以下			
なたね	船舶		第18468号 ティベック 容積10㎡当り 0.5~2.6袋	2~5日間	20℃以上		くん蒸 ただし、 出庫2日前までに くん蒸を終了する こと	-
				3~6日間 (2~6日間)	15~20℃			
				4日間以上 (3日間以上)	15℃以下			
葉たばこ	倉庫	タバコシバンムシ チャマダラメイガ	容積10㎡当り 0.5~2.6袋	2~5日間	20℃以上		くん蒸	
				3~6日間	15~20℃			
				4日間以上	15℃以下			
日本なし	倉庫 コンテナ	ハダニ類	第7184号 ホストキシソ 小型錠剤 容積1㎡当り 7.5錠 第7185号 ホストキシソ 容積1㎡当り 1.5錠 第18468号 ティベック 容積10㎡当り 1.33袋	1日間	15~25℃		くん蒸	